

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

**ДИНАМИКА НАРКОМАНИЙ,
ХРОНИЧЕСКОГО АЛКОГОЛИЗМА И АЛКОГОЛЬНЫХ
ПСИХОЗОВ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
в 2021–2023 гг.**

г. Йошкар-Ола
2024

Информационно-аналитический бюллетень подготовлен отделом организации надзора (по ведению социально-гигиенического мониторинга) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл в соответствии с административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению государственной функции по информированию органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и населения о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утверждённым приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 № 656.

Анализ заболеваемости на территории Республики Марий Эл проведён в рамках ведения государственной системы социально-гигиенического мониторинга в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 № 60 «Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга».

Для подготовки информационного бюллетеня использованы данные форм государственной статистической отчетности № 11 «Сведения о заболеваниях наркологами расстройств», № 37 «Сведения о пациентах, больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями», представленных ГУ Республики Марий Эл «Республиканский наркологический диспансер».

Данные информационного бюллетеня могут быть использованы при разработке мероприятий, направленных на сохранение здоровья населения.

Под редакцией руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл
к.м.н. С.И. Булатовой

Злоупотребление психоактивными веществами (ПАВ) является одной из острейших глобальных проблем во многих странах мира. За последние годы в Республике Марий Эл отмечается рост употребления данных веществ населением, в том числе несовершеннолетними, что сопровождается серьёзными негативными, социальными, медицинскими, экономическими и правовыми последствиями.

Первичная заболеваемость населения Республики Марий Эл наркологическими расстройствами. В 2023 г. общее количество вновь выявленных больных наркологическими заболеваниями в республике составило 666 чел. (в 2022 г. – 765 чел.; в 2021 г. – 593 чел.; в 2020 г. – 632), в том числе:

- потребителей алкоголя – 565 чел. (в 2022 г. – 663 чел.; в 2021 г. – 503 чел.; в 2020 г. – 562), из них: больных синдромом зависимости от алкоголя – 305 чел. (в 2022 г. – 350 чел.; в 2021 г. – 215; в 2020 г. – 266); больных алкогольным психозом – 176 чел. (в 2022 г. – 188 чел.; в 2021 г. – 187; в 2020 г. – 186); больных с пагубным употреблением алкоголя – 84 чел. (в 2022 г. – 125 чел.; в 2021 г. – 101; в 2020 г. – 110);

- потребителей наркотиков – 101 чел. (в 2022 г. – 102 чел.; в 2021 г. – 88; в 2020 г. – 68 чел.): больных синдромом зависимости от наркотических веществ – 34 чел. (в 2022 г. – 37 чел.; в 2021 г. – 29; в 2020 г. – 23 чел.); больных с пагубным употреблением наркотических веществ – 67 чел. (в 2022 г. – 65 чел.; в 2021 г. – 59; в 2020 г. – 45 чел.);

- потребителей ненаркотических веществ – не выявлено (в 2022 г. – не выявлено; в 2021 г. – 2; в 2020 г. – 2 чел.).




Рис. 1. Структура вновь выявленных больных наркологическими расстройствами по Республике Марий Эл в 2023 году

В 2023 г. в сравнении с 2022 г. произошло снижение количества вновь выявленных лиц, страдающих наркологическими расстройствами, на 12,8%, показатель составил – 99,2 на 100 тыс. населения (по РФ в 2022 г. – 91,7; по ПФО – 114,8).

В структуре вновь выявленных больных наркологическими заболеваниями наибольший удельный вес приходится на потребителей алкоголя – 84,7%. Особую тревогу вызывает всё более активное приобщение к потреблению алкоголя подростков и женщин, что значительно увеличивает риск развития алкогольных заболеваний и степень негативного воздействия алкоголизации на здоровье подрастающих поколений.

Уровень заболеваемости населения республики синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольный психоз, в 2023 г. уменьшился на 10,7% по сравнению с 2022 г., он на 4,1% больше среднесноголетнего уровня (далее – СМУ) за 2020–2022 гг., показатель составил 71,5 на 100 тыс. населения (в 2022 г. – 80,1; в 2021 г. – 59,5; в 2020 г. – 66,5; СМУ (2020–2022 гг.) – 68,7; по РФ в 2022 г. – 46,5, по ПФО – 61,0 на 100 тыс. населения).

В 2023 г. наиболее высокие показатели заболеваемости синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольный психоз, превышающие среднереспубликанский показатель (71,5 на 100 тыс. населения), отмечены в муниципальных образованиях: Оршанский район, г. Козьмодемьянск, Горномарийский, Советский районы, г. Волжск, Параньгинский, Мари-Турекский, Юринский, Волжский, Куженерский, Моркинский, Сернурский и Медведевский районы (рис. 2).




Рис. 2. Заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольный психоз, в 2023 году (на 100 тыс. населения)

Ниже среднереспубликанского показателя заболеваемости в г. Йошкар-Оле, Новоторъяльском, Килемарском и Звениговском районах.

Показатели заболеваемости в 2023 г. превышают СМУ (2020–2022 гг.) в г. Йошкар-Оле, Оршанском, Звениговском, Сернурском, Параньгинском,

Мари-Турекском, Юринском, Горномарийском районах и г. Козьмодемьянске (табл. 1).

Таблица 1

Заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольный психоз, по Республике Марий Эл в 2023 г. в сравнении со СМУ (2020-2022 гг.)

Муниципальные образования	2020 г.		2021 г.		2022 г.		СМУ за 2020-2022 гг.	2023 г.		сравнение 2023 г. со СМУ
	абс. число	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	на 100 тыс. насел.
г. Волжск	63	118,4	49	93,0	65	125,2	112,2	52	99,7	-11,1%
Волжский район	15	69,8	21	99,1	24	115,2	94,7	17	82,4	-13,0%
г. Козьмодемьянск	22	109,7	13	65,1	25	126,6	100,5	23	118,8	+18,2%
Горномарийский район	18	86,5	19	92,8	26	130,2	103,2	21	105,6	+2,3%
Звениговский район	29	72,1	14	35,1	26	66,2	57,8	27	69,5	+20,2%
Килемарский район	15	126,5	4	34,4	11	96,0	85,6	7	62,4	-27,1%
Куженерский район	13	103,7	14	114,6	12	101,0	106,4	9	77,3	-27,3%
Мари-Турекский район	17	91,2	18	98,7	13	73,1	87,7	17	97,7	+11,4%
Медведевский район	50	73,4	51	75,5	57	85,5	78,1	49	72,4	-7,3%
Моркинский район	26	94,9	22	81,7	24	91,5	89,4	20	76,5	-14,4%
Новоторъяльский район	12	84,1	7	50,1	10	73,2	69,1	8	58,8	-14,9%
Оршанский район	10	76,0	22	170,4	16	127,6	124,7	20	161,6	+29,6%
Параньгинский район	11	79,1	9	66,0	15	112,2	85,8	13	98,6	+14,9%
Сернурский район	12	52,0	7	30,8	24	107,5	63,4	16	74,2	+17,0%
Советский район	34	120,0	27	97,0	31	113,0	110,0	27	102,4	-6,9%
Юринский район	8	116,9	5	75,9	5	79,2	90,7	6	97,7	+7,7%
г. Йошкар-Ола	97	34,0	100	34,9	154	53,1	40,7	149	50,7	+24,6%
Республика Марий Эл	452	66,5	402	59,5	538	80,1	68,7	481	71,5	+4,1%
Российская Федерация		40,3		46,3		46,5	44,4			

В 2023 г. показатель заболеваемости алкогольным психозом снизился на 6,4% в сравнении с 2022 г., также он на 10,3% ниже СМУ (2020-2022 гг.) и составляет 26,2 на 100 тыс. населения (в 2022 г. – 28,0; в 2021 г. – 27,7; в 2020 г. – 27,4; СМУ – 27,7; по РФ в 2022 г. – 9,9; по ПФО – 12,8). Показатели заболеваемости алкогольным психозом выше среднереспубликанского в 2023 г. отмечены в Советском, Куженерском, Оршанском районах, г. Козьмодемьянске, Горномарийском, Мари-Турекском, Параньгинском, Юринском, Медведевском и Килемарском районах (рис. 3).

Показатели заболеваемости алкогольным психозом в 2023 г. превышают СМУ (2020-2022 гг.) в Звениговском, Советском, Куженерском, Оршанском, Мари-Турекском районах, г. Козьмодемьянске и г. Йошкар-Оле (табл. 2). Высокие показатели заболеваемости населения алкогольным психозом по среднемуголетним данным зарегистрированы в Советском, Куженерском, Оршанском районах, г. Козьмодемьянске, Горномарийском и Мари-Турекском районах.




Рис. 3. Заболеваемость алкогольным психозом в 2023 году (на 100 тыс. населения)

Таблица 2

**Заболеваемость населения алкогольным психозом по Республике Марий Эл
в 2023 г. в сравнении со СМУ (2020–2022 гг.)**

Муниципальные образования	2020 г.		2021 г.		2022 г.		СМУ за 2020–2022 гг.	2023 г.		сравнение 2023 г. со СМУ
	абс. число	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	на 100 тыс. насел.
г. Волжск	15	28,2	10	19,0	15	28,9	22,6	7	13,4	–40,7%
Волжский район	4	18,6	10	47,2	4	19,2	34,2	2	9,7	–в 3,5 раза
г. Козьмодемьянск	11	54,8	6	30,1	8	40,5	36,6	8	41,3	+12,8%
Горномарийский район	9	43,2	8	39,1	10	50,1	44,7	8	40,2	–10,1%
Звениговский район	8	19,9	4	10,0	7	17,8	18,2	10	25,8	+41,8%
Килемарский район	7	59,0	3	25,8	7	61,1	45,0	3	26,8	–40,4%
Куженерский район	8	63,8	7	57,3	5	42,1	53,3	8	68,8	+29,1%
Мари-Турекский район	4	21,5	8	43,9	5	28,1	37,5	7	40,2	+7,2%
Медведевский район	27	39,7	30	44,4	25	37,5	44,4	22	32,5	–26,8%
Моркинский район	12	43,8	10	37,1	8	30,5	42,5	6	23,0	–48,0%
Новоторъяльский район	11	77,1	5	35,8	3	22,0	44,5	3	22,1	– в 2 раза
Оршанский район	5	38,0	3	23,2	2	15,9	50,4	7	56,6	+12,3%
Параньгинский район	4	28,8	3	22,0	4	29,9	42,7	5	37,9	–11,2%
Сернурский район	4	17,3	5	22,0	8	35,8	23,0	4	18,5	–19,6%
Советский район	15	52,9	15	53,9	12	43,8	51,9	19	72,0	+38,7%
Юринский район	5	73,1	4	60,7	3	47,5	58,8	2	32,6	–44,6%
г. Йошкар-Ола	37	12,9	56	19,5	62	21,4	17,9	55	18,7	+4,5%
Республика Марий Эл	186	27,4	187	27,7	188	28,0	29,2	176	26,2	–10,3%
Российская Федерация		10,4		9,7		9,9	10,0			

В 2023 г. на долю мужчин приходилось от 0% (в Куженерском районе) до 100% (в г. Козьмодемьянске и Юринском районе) заболеваний синдромом зависимости от алкоголя (табл. 3).

Таблица 3

**Данные о возрастно-половом составе заболеваемости населения
синдромом зависимости от алкоголя и алкогольным психозом за 2023 год**

Муниципальные образования	всего	в том числе			
		мужчины		женщины	
		абс. число	%	абс. число	%
Синдром зависимости от алкоголя					
г. Волжск	45	24	53,3	21	46,7
Волжский район	15	7	46,7	8	53,3
г. Козьмодемьянск	15	15	100	0	0,0
Горномарийский район	13	12	92,3	1	7,7
Звениговский район	17	15	88,2	2	11,8
Килемарский район	4	2	50,0	2	50,0
Куженерский район	1	0	0,0	1	100
Мари-Турекский район	10	8	80,0	2	20,0
Медведевский район	27	17	63,0	10	37,0
Моркинский район	14	9	64,3	5	35,7
Новоторъяльский район	5	3	60,0	2	40,0
Оршанский район	13	11	84,6	2	15,4
Параньгинский район	8	4	50,0	4	50,0
Сернурский район	12	8	66,7	4	33,3
Советский район	8	5	62,5	3	37,5
Юринский район	4	4	100	0	0,0
г. Йошкар-Ола	94	70	74,5	24	25,5
Республика Марий Эл	305	214	70,2	91	29,8
Алкогольный психоз					
г. Волжск	7	4	57,1	3	42,9
Волжский район	2	2	100	0	0,0
г. Козьмодемьянск	8	7	87,5	1	12,5
Горномарийский район	8	6	75,0	2	25,0
Звениговский район	10	8	80,0	2	20,0
Килемарский район	3	3	100	0	0,0
Куженерский район	8	6	75,0	2	25,0
Мари-Турекский район	7	5	71,4	2	28,6
Медведевский район	22	17	77,3	5	22,7
Моркинский район	6	6	100	0	0,0
Новоторъяльский район	3	3	100	0	0,0
Оршанский район	7	7	100	0	0,0
Параньгинский район	5	5	100	0	0,0
Сернурский район	4	2	50,0	2	50,0
Советский район	19	16	84,2	3	15,8
Юринский район	2	2	100	0	0,0
г. Йошкар-Ола	55	43	78,2	12	21,8
Республика Марий Эл	176	142	80,7	34	19,3

Показатель заболеваемости населения республики синдромом зависимости от наркотических веществ в 2023 г. уменьшился в сравнении с 2022 г. на 7,3%: с 5,5 (37 чел.) до 5,1 (34 чел.) на 100 тыс. населения; в сравнении со СМУ (2020–2022 гг.) увеличился на 15,9% (СМУ – 4,4 на 100 тыс. населения). Показатель ниже уровня РФ и ПФО (2022 г.) в 1,9 и 1,6 раза соответственно (РФ – 9,6; ПФО – 8,2).

Случаи заболеваний населения синдромом зависимости от наркотических веществ в 2023 г. выявлены в г. Волжске (23,0 на 100 тыс. населения; 12 случаев), г. Йошкар-Оле (4,1; 12 случаев), Медведевском (10,3; 7 случаев), Параньгинском (7,6; 1 случай), Моркинском (3,8; 1 случай) и Звениговском (2,6; 1 случай) районах (табл. 4, рис. 4).

Таблица 4

Заболеваемость населения синдромом зависимости от наркотических веществ по Республике Марий Эл в 2023 г. в сравнении со СМУ (2020-2022 гг.)

Муниципальные образования	2020 г.		2021 г.		2022 г.		СМУ за 2020-2022 гг.	2023 г.		сравнение 2023 г. со СМУ
	абс. число	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	на 100 тыс. насел.
г. Волжск	5	9,4	7	13,3	1	1,9	8,2	12	23,0	+в 2,8 раза
Волжский район	0	0,0	0	0	2	9,6	3,2	0	0,0	–
г. Козьмодемьянск	1	5,0	0	0	1	5,1	3,4	0	0,0	–
Горномарийский район	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
Звениговский район	0	0,0	0	0	2	5,1	1,7	1	2,6	+в 1,5 раза
Килемарский район	0	0,0	1	8,6	0	0,0	2,9	0	0,0	–
Куженерский район	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
Мари-Турекский район	0	0,0	0	0	1	5,6	1,9	0	0,0	+
Медведевский район	7	10,3	2	3,0	4	6,0	6,4	7	10,3	+на 60,9%
Моркинский район	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	1	3,8	–
Новоторъяльский район	1	7,0	0	0	0	0,0	2,3	0	0,0	–
Оршанский район	1	7,6	1	7,8	0	0,0	5,1	0	0,0	–
Параньгинский район	0	0,0	1	7,3	1	7,5	4,9	1	7,6	+в 1,6 раза
Сернурский район	0	0,0	1	4,4	1	4,5	3,0	0	0,0	–
Советский район	0	0,0	1	3,6	0	0,0	1,2	0	0,0	–
Юринский район	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
г. Йошкар-Ола	8	2,8	15	5,2	24	8,3	5,4	12	4,1	–на 24,1%
Республика Марий Эл	23	3,4	29	4,3	37	5,5	4,4	34	5,1	+на 15,9%
Российская Федерация		8,5		9,5		9,6	9,2			

Выше среднемноголетних показателей заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотических веществ зарегистрированы показатели в г. Волжске, Звениговском, Медведевском, Моркинском и Параньгинском районах.




Рис. 4. Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ в 2023 году (на 100 тыс. населения)

В республике в 2023 г. не зарегистрировано лиц с синдромом зависимости от ненаркотических веществ (в 2019–2022 гг. – не зарегистрировано).

Болезненность (распространённость) населения Республики Марий Эл наркологическими расстройствами. В 2023 г. общее количество зарегистрированных (состоящих на учёте) больных наркологического профиля в республике в сравнении с 2022 г. увеличилось на 2,1% и составило 11853 чел. (в 2022 г. – 11607).

В 2023 г. показатель болезненности (распространённости) населения синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы, в целом по республике составил 1341,0 на 100 тыс. населения (9016 чел.), это практически на уровне 2022 г. (в 2022 г. – 1346,5; в 2021 г. – 1503,4; в 2020 г. – 1229,1). В 2023 г. выше среднереспубликанского уровня данный показатель отмечен в г. Волжске, Советском, Оршанском, Моркинском и Куженерском районах. Наиболее низкие показатели зарегистрированы в Звениговском, Юринском, Медведевском, Сернурском районах и г. Козьмодемьянске (рис. 5).

По среднемноголетнему уровню (2020-2022 гг.) болезненности населения синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы, первые ранговые места занимают г. Волжск, Оршанский, Советский и Волжский районы (табл. 5).




Рис. 5. Болезненность хроническим алкоголизмом и алкогольным психозом в 2023 году (на 100 тыс. населения)

Таблица 5

Болезненность населения синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольный психоз, по Республике Марий Эл в 2023 г. в сравнении со СМУ (2020-2022 гг.)

Муниципальные образования	2020 г.		2021 г.		2022 г.		СМУ за 2020-2022 гг.	2023 г.		сравнение 2022 г. со СМУ
	абс. число	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	на 100 тыс. насел.
г. Волжск	1496	2811,2	1445	2741,8	1447	2787,4	2780,1	1510	2894,7	+4,1%
Волжский район	394	1832,4	376	1774,6	391	1877,0	1828,0	384	1861,1	+1,8%
г. Козьмодемьянск	129	643,0	139	696,0	154	780,1	706,4	150	775,0	+9,7%
Горномарийский район	223	1071,3	209	1020,7	210	1051,6	1047,9	235	1181,4	+12,7%
Звениговский район	255	634,3	228	571,1	224	570,4	591,9	229	589,8	-0,4%
Килемарский район	133	1121,5	131	1126,8	137	1195,1	1147,8	134	1195,3	+4,1%
Куженерский район	177	1411,9	249	2038,6	199	1674,8	1708,4	169	1452,3	-15,0%
Мари-Турекский район	201	1077,8	203	1112,8	205	1153,5	1114,7	210	1206,5	+8,2%
Медведевский район	502	737,4	510	755,3	501	751,5	748,1	503	743,2	-0,7%
Моркинский район	416	1518,0	400	1485,3	400	1524,9	1509,4	390	1492,1	-1,1%
Новоторъяльский район	122	854,7	119	851,2	122	892,9	866,3	124	912,0	+5,3%
Оршанский район	245	1862,0	244	1890,2	243	1937,2	1896,5	235	1898,4	+0,1%
Параньгинский район	128	920,4	124	908,7	125	934,8	921,3	126	955,9	+3,8%
Сернурский район	160	693,6	155	682,9	167	748,0	708,2	175	811,2	+14,5%
Советский район	523	1846,2	510	1831,5	509	1855,9	1844,5	503	1907,0	+3,4%
Юринский район	32	467,8	36	546,3	37	586,3	533,5	40	651,4	+22,1%
г. Йошкар-Ола	3215	1126,1	5075	1769,1	3970	1368,6	1421,3	3899	1325,6	-6,7%
Республика Марий Эл	8351	1229,1	10153	1503,4	9041	1346,5	1359,7	9016	1341,0	-1,4%
Российская Федерация		810,2		818,2		802,0	810,1			

В 2023 г. в сравнении со СМУ распространённость синдрома зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы, увеличилась в Юринском районе, г. Козьмодемьянске, Сернурском, Новоторьяльском, Килемарском, Куженерском, Параньгинском, Волжском, Оршанском, Горномарийском и Моркинском районах.

Показатель болезненности населения республики алкогольным психозом в 2023 г. в сравнении с 2022 г. снизился на 2,9% и составил 54,0 на 100 тыс. населения (в 2022 г. – 55,6; в 2021 г. – 54,8; в 2020 г. – 56,5). Показатели болезненности алкогольным психозом выше среднереспубликанского отмечались в Советском, Куженерском, Горномарийском, Оршанском районах, г. Козьмодемьянске, Сернурском, Медведевском и Мари-Турекском районах. Наиболее низкие показатели отмечены в Волжском, Новоторьяльском, Параньгинском и Юринском районах. В сравнении со СМУ (2020–2022 гг.) болезненность алкогольным психозом в 2023 г. увеличилась в г. Козьмодемьянске, Горномарийском, Звениговском, Куженерском, Мари-Турекском, Оршанском, Советском, Сернурском районах и г. Йошкар-Оле (табл. 6, рис. 6).

Таблица 6

**Болезненность населения алкогольным психозом
по Республике Марий Эл в 2023 г. в сравнении со СМУ (2019-2021 гг.)**

Муниципальные образования	2020 г.		2021 г.		2022 г.		СМУ за 2020-2022 гг.	2023 г.		сравнение 2023 г. со СМУ
	абс. число	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	на 100 тыс. насел.
г. Волжск	63	118,4	42	79,7	45	86,7	94,9	11	21,1	–в 4,5 раза
Волжский район	18	83,7	21	99,1	17	81,6	88,1	2	9,7	–в 9,1 раза
г. Козьмодемьянск	13	64,8	14	70,1	10	50,7	61,9	18	93,0	+50,2%
Горномарийский район	14	67,3	14	68,4	14	70,1	68,6	20	100,6	+46,6%
Звениговский район	9	22,4	6	15,0	14	35,7	24,4	17	43,8	+в 1,8 раза
Килемарский район	13	109,6	6	51,6	9	78,5	79,9	5	44,6	–в 1,8 раза
Куженерский район	13	103,7	9	73,7	9	75,7	84,4	18	154,7	+в 1,8 раза
Мари-Турекский район	8	42,9	14	76,8	7	39,4	53,0	10	57,5	+8,5%
Медведевский район	50	73,4	53	78,5	50	75,0	75,6	40	59,1	–21,8%
Моркинский район	20	73,0	15	55,7	15	57,2	62,0	10	38,3	–38,2%
Новоторьяльский район	14	98,1	11	78,7	6	43,9	73,6	4	29,4	–в 2,5 раза
Оршанский район	8	60,8	9	69,7	3	23,9	51,5	12	96,9	+в 1,9 раза
Параньгинский район	7	50,3	8	58,6	7	52,3	53,7	4	30,4	–43,4%
Сернурский район	17	73,7	20	88,1	18	80,6	80,8	19	88,1	+9,0%
Советский район	35	123,6	29	104,1	41	149,5	125,7	42	159,2	+26,7%
Юринский район	5	73,1	4	60,7	5	79,2	71,0	2	32,6	–в 2,2 раза
г. Йошкар-Ола	77	27,0	95	33,1	103	35,5	31,9	129	43,9	+37,6%
Республика Марий Эл	384	56,5	370	54,8	373	55,6	55,6	363	54,0	–2,9%
Российская Федерация		26,9		25,2		24,4	25,5			




Рис. 6. Болезненность алкогольным психозом в 2023 году (на 100 тыс. населения)

Показатель болезненности населения республики синдромом зависимости от наркотических веществ в 2023 г. увеличился на 2,2% в сравнении с 2022 г. и составил 139,1 на 100 тыс. населения (в 2022 г. – 136,1; в 2021 г. – 127,5; в 2020 г. – 127,0). Наиболее высокие показатели отмечались в г. Волжске, Оршанском районе и г. Йошкар-Оле (рис. 7).




Рис. 7. Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ в 2023 году (на 100 тыс. населения)

В сравнении со СМУ (2020–2022 гг.) болезненность населения синдромом зависимости от наркотических веществ в 2023 г. снизилась лишь в Волжском районе, г. Козьмодемьянске, Новоторьяльском, Юринском и Оршанском районах (табл. 7).

Таблица 7

**Болезненность населения синдромом зависимости от наркотических веществ
по Республике Марий Эл в 2023 г. в сравнении со СМУ (2020-2022 гг.)**

Муниципальные образования	2020 г.		2021 г.		2022 г.		СМУ за 2020-2022 гг.	2023 г.		сравнение 2023 г. со СМУ
	абс. число	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	на 100 тыс. насел.
г. Волжск	298	560,0	282	535,1	276	531,7	542,3	272	521,4	–3,9%
Волжский район	17	79,1	18	85,0	18	86,4	83,5	18	87,2	+4,4%
г. Козьмодемьянск	14	69,8	12	60,1	15	76,0	68,6	12	62,0	–9,6%
Горномарийский район	2	9,6	2	9,8	2	10,0	9,8	2	10,1	+3,1%
Звениговский район	10	24,9	7	17,5	14	35,7	26,0	17	43,8	+в 1,7 раза
Килемарский район	3	25,3	5	43,0	6	52,3	40,2	6	53,5	+33,1%
Куженерский район	2	15,9	2	16,4	3	25,2	19,2	3	25,8	+34,4%
Мари-Турекский район	0	0,0	0	0	1	5,6	1,9	2	11,5	+в 6,1 раза
Медведевский район	49	72,0	42	62,2	46	69,0	67,7	48	70,9	+4,7%
Моркинский район	14	51,1	15	55,7	15	57,2	54,7	17	65,0	+18,8%
Новоторьяльский район	6	42,0	6	42,9	6	43,9	42,9	5	36,7	–14,5%
Оршанский район	21	159,6	24	185,9	24	191,3	178,9	22	177,7	–0,7%
Параньгинский район	2	14,4	1	7,3	3	22,4	14,7	5	37,9	+в 2,6 раза
Сернурский район	12	52,0	11	48,5	10	44,8	48,4	14	64,9	+34,1%
Советский район	12	42,4	15	53,9	15	54,7	50,3	14	53,1	+5,6%
Юринский район	2	29,2	1	15,2	1	15,8	20,1	1	16,3	–18,9%
г. Йошкар-Ола	399	139,7	418	145,7	459	158,2	147,9	477	162,2	+9,7%
Республика Марий Эл	863	127,0	861	127,5	914	136,1	130,2	935	139,1	+6,8%
Российская Федерация		152,7		155,5		157,8	155,3			

Зарегистрированные больные синдромом зависимости от наркотических веществ в 2023 г. в своём большинстве молодое трудоспособное население старше 18 лет, мужского пола (86,8%), употребляющие наркотики группы опиоидов (24,1%), психостимуляторы (8,3%), каннабиноиды (4,5%), другие наркотические вещества и их сочетания (63,1%).

Категория пациентов, употребляющих наркотики инъекционным способом, является группой риска распространения ВИЧ-инфекции и других парентеральных инфекций. Всего на 01.01.2024 в республике зарегистрировано 502 чел., потребляющих наркотики инъекционным способом, что составляет 26,6% от общего количества потребителей наркотических веществ. Число лиц, состоящих на учёте в связи употреблением наркотических веществ и имеющих ВИЧ-инфекцию, в сравнении с 2022 г. увеличилось на 5,2% (162 и 154 чел.). Число лиц, состоящих на наркологическом учёте и имеющих гепатит В и/или С, в сравнении с 2022 г. увеличилось на 4,6% (704 и 673).

Показатель болезненности населения синдромом зависимости от ненаркотических веществ (токсикоманией) в 2023 г. снизился в сравнении с 2022 г. на 18,2% (на 1 случай) и составил 0,9 на 100 тыс. населения. Больные токсикоманией в 2023 г. состояли на учёте в г. Йошкар-Оле (6 чел.).

Не состояло на учёте больных токсикоманией в 2020–2023 гг. во всех муниципальных образованиях республики, кроме г. Йошкар-Олы, Горномарийского и Звениговского районов (табл. 8).

Таблица 8

Болезненность населения синдромом зависимости от ненаркотических веществ по Республике Марий Эл в 2022 г. в сравнении со СМУ (2020-2022 гг.)

Муниципальные образования	2020 г.		2021 г.		2022 г.		СМУ за 2019-2021 гг.	2023 г.		сравнение 2023 г. со СМУ
	абс. число	на 100 тыс. нас.	абс. число	на 100 тыс. нас.	абс. число	на 100 тыс. нас.	на 100 тыс. нас.	абс. число	на 100 тыс. нас.	на 100 тыс. нас.
г. Волжск	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
Волжский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
г. Козьмодемьянск	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
Горномарийский район	1	4,8	1	4,9	0	0,0	3,2	0	0,0	–
Звениговский район	2	5,0	2	5,0	2	5,1	5,0	0	0,0	–
Килемарский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
Куженерский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
Мари-Турекский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
Медведевский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
Моркинский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
Новоторъяльский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
Оршанский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
Параньгинский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
Сернурский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
Советский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
Юринский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
г. Йошкар-Ола	5	1,8	5	1,7	5	1,7	1,7	6	2,0	+17,6%
Республика Марий Эл	8	1,2	8	1,2	7	1,0	1,1	6	0,9	–18,2%
Российская Федерация		3,7		3,5		3,4	3,5			

Первичная заболеваемость и общая заболеваемость (распространённость) детей и подростков наркологическими расстройствами. В 2023 г. не зарегистрировано детей 0–14 лет и подростков 15–17 лет с впервые выявленным диагнозом «синдром зависимости от алкоголя» (в 2019–2022 гг. – не выявлено), с впервые выявленным диагнозом «синдром зависимости от ненаркотических веществ» (в 2019–2022 гг. – не выявлено). С впервые выявленным диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ» в 2023 г. зарегистрировано 2 подростка (в 2022 г. – 3; в 2021 г. – 1; в 2020 г. – 2).

В 2023 г. состоят на учёте на конец года:

- с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ» – 6 подростков (в 2022 г. – 7; в 2021 г. – 2; в 2020 г. – 2);
- с диагнозом «синдром зависимости от ненаркотических веществ» – дети и подростки не состоят на учёте (в 2022 г. – 0; в 2021 г. – 1; в 2020 г. – 1);
- с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя» – 1 подросток (в 2022г. – 2; в 2021 г. – не зарегистрировано; в 2020 г. – 1).

Приведённые данные не охватывают весь контингент больных наркологического профиля, но в достаточной мере отражают основные тенденции заболеваемости наркологическими расстройствами населения Республики Марий Эл в 2023 г. и позволяют сделать следующие **выводы**:

- показатель заболеваемости населения республики синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольный психоз, в 2023 г. снизился на 10,7% в сравнении с 2021 г., но он на 4,1% больше СМУ (2020–2022 гг.);
- показатель заболеваемости алкогольным психозом в 2023 г. снизился на 6,4% в сравнении с 2022 г. и на 10,3% ниже СМУ (2020–2022 гг.);
- показатель заболеваемости населения республики синдромом зависимости от наркотических веществ в 2023 г. снизился в сравнении с 2022 г. на 7,3%: с 5,5 (37 чел.) до 5,1 (34 чел.) на 100 тыс. населения; но в сравнении со СМУ (2020-2022 гг.) увеличился на 15,9%;
- в структуре заболеваемости наркологическими расстройствами, впервые выявленными в 2023 г., лидируют алкогольные расстройства (синдром зависимости от алкоголя, алкогольный психоз, употребление алкоголя с вредными последствиями для здоровья) – 84,8%; на расстройства, связанные с употреблением наркотических веществ, приходится 15,2%; расстройств, связанных с употреблением ненаркотических веществ с вредными последствиями не зарегистрировано;
- наибольшее количество наркологических расстройств приходится на возрастные группы 20–39 лет и 40–59 лет, т.е. на население трудоспособного возраста.

Ситуация в Республике Марий Эл по заболеваемости наркологическими расстройствами требует пристального внимания как со стороны органов местного самоуправления, так и со стороны исполнительной власти республики и общественности. В Республике Марий Эл показатели заболеваемости синдромом зависимости от алкоголя (хроническим алкоголизмом) превышают среднероссийские показатели в течение многих лет, в связи с чем существует необходимость продолжения работы в данном направлении, углублённом изучении ситуации и принятии эффективных мер по пропаганде трезвого и здорового образа жизни среди населения.